

schild länger als breit, mittelstark, wenig dicht punktiert, die Punkte etwas länglich. Flügeldecken so breit und kaum doppelt so lang als der Halsschild, die Punkte ganz so wie am Halsschild, dichter gestellt, etwas gereiht, neben der Naht am Absturze breit verflacht.

Anatolien: Adalia. Von Herrn N. Joh. Tellalian aufgefunden.

14. *Phytoecia puncticollis* var. nov. **aladaghensis**.

Wie die Stammform, die ganzen Beine bis auf die roten Vordersehienen (manchmal auch deren Knie), sowie der Bauch schwarz.

Aus dem Ala-Dagh in Persien: vom Herrn Major Fr. Hauser zahlreich eingesendet.

15. *Chaetocnema Vincenti* n. sp.

Parva, nigra, supra aeneocuprea, elytris apice flavomaculatis, antennarum basi, tarsis tibiisque testaceis; capite alutaceo, sparsissime punctato, prothorace transverso, antrorsum angustato, alutaceo, dense punctulato; scutello parvulo, sublaevi, elytris breviter oratis, leviter convexis, sat dense et fortiter punctato-striatis, striola scutellari conspicua, interstitiis plavis, nitidis, rix perspicue punctulatis; tibiis apicem versus paullo infuscatis. Long. 1.6 mm.

Aegypten, von Herrn Victor Vincent im August bei den Pyramiden gesammelt.

Diese Art steht der *concinna* und *tibialis* nahe: von der Form, Größe und Skulptur der letzteren, aber die Flügeldecken haben viel stärkere Punktstreifen und die Spitze derselben hat eine große braungelbe Apikalmakel: die Basalstrichelchen des Halsschildes sind kaum zu erkennen.

Eine neue Varietät des *Colou viennense* Herbst.

Von Sanitätsrat **Dr. A. Fleischer** in Brünn.

Herr Giuseppe Rangoni (Modena) fand in den Veltliner Alpen und zwar S. Caterina, 1880 m über dem Meeresspiegel, nebst hochinteressanten *Liodes*-Arten auch zwei übereinstimmende Exemplare von *Colou viennense*, welche sich von der Stammform wesentlich durch viel längere, rauhe und abstehende Behaarung unterscheiden. Ich nenne diese Varietät: v. **hirtellum** n.